

ชื่อเรื่อง : การพัฒนารูปแบบการพยาบาลเจ้าของไข้ ในงานห้องผู้ป่วยหนักศัลยกรรม
โรงพยาบาลแพร์
ผู้วิจัย : นางสาววัฒนา เกตุวีระพงศ์
สถานที่ปรึกษา : รศ.ดร.พิมพ์จรัส อยู่สวัสดิ์
กรรมการที่ปรึกษา : ดร.ชมนาด วรรณพรศิริ
ประเภทสารนิพนธ์ : วิทยานิพนธ์ พย.ม.(การบริหารการพยาบาล) มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2549

บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการพยาบาลเจ้าของไข้ ในงานห้องผู้ป่วยหนักศัลยกรรม โรงพยาบาลแพร์ การดำเนินการวิจัยเป็น 3 ระยะ คือ ระยะเตรียมการ ระยะพัฒนารูปแบบและระยะประเมินผลลัพธ์ ประชากรที่ศึกษาประกอบด้วยพยาบาลวิชาชีพ 16 คนและผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในงานห้องผู้ป่วยหนักศัลยกรรมจำนวน 46 คน เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพโดยวิธีการสนทนากลุ่ม การสังเกตแบบมีส่วนร่วม การบันทึกภาคสนาม และการสัมภาษณ์เชิงลึก วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา และข้อมูลเชิงปริมาณเก็บรวบรวมโดยการให้แบบสอบถามและแบบตรวจสอบเอกสารเวชระเบียนผู้ป่วยใน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบที ระยะเวลาในการศึกษาตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ ถึง พฤศจิกายน 2548

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

1. การพัฒนารูปแบบการพยาบาลเจ้าของไข้ เป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดูแลจากทีมพยาบาลที่ไม่สมบูรณ์เป็นการพยาบาลเจ้าของไข้ประกอบด้วย การเปลี่ยนแปลง 4 ระยะ คือ 1) ระยะเข้าใจสภาพปัญหาและร่วมกันหารูปแบบใหม่ 2) ระยะเผชิญปัญหาเมื่อเริ่มปฏิบัติ 3) ระยะแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่บทบาทใหม่ 4) ระยะพึงพอใจในบทบาท กลวิธีที่ใช้ในการพัฒนาประกอบด้วย การสะท้อนคิด การให้ข้อมูลและความรู้ การให้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และตัดสินใจ การอำนวยความสะดวก การให้กำลังใจ การทำเป็นแบบอย่าง การเป็นที่ปรึกษา และการเสริมสร้างพลังอำนาจ

2. รูปแบบการพยาบาลเจ้าของไข้ในงานห้องผู้ป่วยหนักศัลยกรรมที่พัฒนาขึ้น มีลักษณะการทำงานเป็นทีมโดยมีพยาบาลวิชาชีพอาวุโสมากที่สุดเป็นหัวหน้าทีม มีการมอบหมายงานให้พยาบาลวิชาชีพเป็นพยาบาลเจ้าของไข้รับผิดชอบดูแลผู้ให้บริการจำนวนหนึ่งอย่างต่อเนื่อง

ตั้งแต่แรกรับจนจำหน่าย ซึ่งต้องมีการวางแผนการพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง และเมื่อไม่ได้ปฏิบัติงานมีพยาบาลผู้ร่วมดูแลรับผิดชอบให้การดูแลแทน

3. คุณภาพการพยาบาลซึ่งเป็นผลลัพธ์ของการใช้รูปแบบการพยาบาลเจ้าของไข้ หลังการพัฒนา ได้แก่ ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ($\bar{x} = 2.48, S.D. = 0.44$) ความพึงพอใจในงานของพยาบาลวิชาชีพในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ($\bar{x} = 3.98, S.D. = 0.60$) ผลการวิเคราะห์การใช้กระบวนการพยาบาลครบขั้นตอนในภาพรวม พบว่ามีการใช้ในระดับมาก ($\bar{x} = 2.77, S.D. = 0.26$) ผลการวิเคราะห์การใช้กระบวนการพยาบาลอย่างต่อเนื่องจากแบบบันทึกในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก ($\bar{x} = 7.83, S.D. = 0.91$) นอกจากนี้ยังพบว่าอัตราการเกิดแผลกดทับระดับ 2 – 4 ลดลงจากระยะก่อนใช้รูปแบบการพยาบาลเจ้าของไข้

Title : DEVELOPMENT OF PRIMARY NURSING MODEL IN
SURGICAL INTENSIVE CARE UNIT, PHRAE HOSPITAL

Author : Mrs.Siriwattana Gateveerapong

Adviser : Assoc. Prof. Dr. Pimjaras Euswas

Coadviser : Dr. Chommanard Wannapomsiri

Type of Degree : Master of Nursing Science Degree in Nursing Administration.
(M.N.S. Nursing Administration), Naresuan University, 2006.

Abstract

The purposes of this action research was to develop primary nursing model in a surgical intensive care unit at Phrae hospital. The research was divided into 3 phases : Preparation phase, the development phase and the evaluation phase. The sample consisted of 16 professional nurses and 46 patients hospitalized in the surgical intensive care unit. Qualitative data were collected by focus group discussion, participant observation, field note and in-dept interview. The qualitative data were analyzed by using content analysis. Quantitative data were collected by questionnaires and check lists from patient records. The quantitative data were analyzed by using mean, standard deviation and t-test. The study was conducted during February to November, 2005.

The findings were as follows :

1. The development of primary nursing model consisted of 4 phases :
1) understanding problems and participation in finding new model ; 2) facing problems at the beginning period of practice ; 3) learning and sharing experiences to perform new roles ; 4) being satisfied with new roles.
2. The strategies used in developing the model consisted of : practice reflection, providing information and knowledge, participation in decision making, facilitating, supporting, role modeling, providing consultation, and empowering.

3. The outcome of nursing quality after implementing primary nursing model were : client satisfaction was at medium level ($\bar{x} = 2.48$, S.D. =0.44) ;nurse satisfaction was at high level ($\bar{x} = 3.98$, S.D. =0.60) ;the outcome of using nursing process (complete step) was at high level ($\bar{x} = 2.77$, S.D. =0.26) ;the outcome of using nursing process (continuous) was at high level ($\bar{x} = 7.83$, S.D. =0.91) ; the outcome of nursing quality also indicated that the occurring rate of pressure sore grade 2–4 was decreased.