



ภาคผนวก ก แบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัย

แบบวัดความสามารถในการกระทำกิจวัตรประจำวันของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

สำหรับผู้วิจัย

ผู้ป่วยรายที่.....

วัน/เดือน/พ.ศ.

1. การรับประทานอาหาร

- 0 ไม่สามารถรับประทานอาหารได้เอง ต้องป้อนอาหารให้ หรือรับอาหารทางสายยาง
- 2 ต้องมีผู้คอยดูแล ช่วยเหลือในการเตรียมอาหาร เช่น ช่วยตัดหรือหั่นอาหาร
- 4 ช่วยตัวเองได้ เมื่อเตรียมอาหารวางไว้

2. การเคลื่อนย้าย

- 0 ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ และทรงตัวไม่ได้
- 2 ต้องมีผู้ช่วยเหลือ 1-2 คน ในการเคลื่อนย้าย นั่งทรงตัวได้
- 4 เคลื่อนย้ายได้โดยมีผู้ช่วยเหลือ 1 คน คอยช่วยพยุง หรือชี้แนะ
- 6 สามารถลุกจากเตียง หรือเคลื่อนย้ายลงมานั่งเก้าอี้เข็น และสามารถถือค้ำเก้าอี้เข็นได้

3. การเดิน

- 0 เคลื่อนไหวไม่ได้
- 2 สามารถใช้เก้าอี้เข็น คลาน หรือ ถัดได้
- 4 เดินได้โดยมีคนช่วยพยุง 1 คน
- 6 เดินได้เอง โดยอาจใช้ไม้เท้า หรือเครื่องเดินพยุง

4. การแต่งตัว สวมใส่เสื้อผ้า

- 0 ไม่สามารถแต่งตัวหรือสวมใส่เสื้อผ้าเองได้
- 2 ต้องมีผู้ช่วยเหลือบ้าง บางขั้นตอน เช่น รูดซิป ติดกระดุม
- 4 แต่งตัว สวมใส่เสื้อผ้าได้

5. การอาบน้ำ เช็ดตัว

- 0 ไม่สามารถอาบน้ำ หรือเช็ดตัวดูแลความสะอาดของร่างกายได้
- 1 ต้องการความช่วยเหลือในบางขั้นตอน
- 2 สามารถอาบน้ำทำความสะอาดร่างกายได้ทั้งฟอกสบู่ตักน้ำราดตัวหรือเช็ดตัวได้ทุกส่วน

4. สุขวิทยาส่วนบุคคล
- 0 ต้องพึ่งพามุคคลอื่นทั้งหมดในการล้างหน้า แปรงฟัน หวีผม หรือโกนหนวด
- 2 ต้องการความช่วยเหลือในบางขั้นตอน
- 4 สามารถล้างหน้า แปรงฟัน หวีผม โกนหนวด
5. การใช้ห้องสุขา หรือกระโถน
- 0 ต้องพึ่งพา เกี่ยวกับการเข้า-ออก ห้องสุขา หรือ การสอด-ดึงกระโถนรวมทั้งการถอด/ใส่เสื้อผ้า การล้างและทำความสะอาดหลังจากการขับถ่าย
- 2 ต้องการความช่วยเหลือในบางขั้นตอน
- 4 สามารถเข้า-ออก ห้องสุขา หรือ การสอด-ดึงกระโถนรวมทั้งการถอด/ใส่เสื้อผ้า การล้างและทำความสะอาดหลังจากการขับถ่าย
6. การควบคุมการขับถ่ายอุจจาระ
- 0 กลั้นไม่ได้ อุจจาระราด กระปริบกระปรอย หรือท้องผูก ต้องสวนอุจจาระให้
- 2 กลั้นได้เป็นส่วนใหญ่ แต่อาจกลั้นไม่ได้ ประมาณสัปดาห์ละ 1 ครั้ง หรือ ต้องการความช่วยเหลือในการสวนอุจจาระ
- 4 กลั้นได้ และ/หรือ ต้องสวนอุจจาระ แต่สามารถทำเองได้
7. การควบคุมการขับถ่ายปัสสาวะ
- 0 กลั้นไม่ได้ ถ่ายปัสสาวะกระปริบกระปรอย /ต้องสวนปัสสาวะหรือดูแลเมื่อคายสวนปัสสาวะ
- 2 กลั้นปัสสาวะไม่ได้ ประมาณวันละ 1 ครั้ง/ ต้องการความช่วยเหลือในการสวนปัสสาวะ หรือดูแลเมื่อคายสวนปัสสาวะ
- 4 กลั้นได้ไม่มีปัสสาวะกระปริบกระปรอย/สวนปัสสาวะหรือดูแลเมื่อคายสวนปัสสาวะได้เอง

ส่วนที่ 1 แบบสัมภาษณ์ข้อมูลทั่วไป

ลำดับที่.....

วัน/เดือน/พ.ศ.....

I ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ดูแล

1. เพศ
 - (1) ชาย
 - (2) หญิง
2. อายุ.....ปี
3. สถานภาพสมรส
 - (1) คู่
 - (2) โสด
 - (3) ม้าย หย่า หรือแยกกันอยู่
4. ศาสนา
 - (1) พุทธ
 - (2) คริสต์
 - (3) อิสลาม
 - (4) อื่นๆ ระบุ.....
5. อาชีพ
 - (1) เกษตรกรรม
 - (2) รับจ้าง
 - (3) ค้าขาย
 - (4) รับราชการ
 - (5) ไม่ได้ประกอบอาชีพ
 - (6) อื่นๆ ระบุ.....
6. ระดับการศึกษา
 - (1) ประถมศึกษา
 - (2) มัธยมศึกษา
 - (3) อนุปริญญา
 - (4) ปริญญาตรี
 - (5) อื่นๆ ระบุ.....
7. รายได้ของครอบครัว.....บาท/เดือน
8. ความสัมพันธ์กับผู้ป่วย
 - (1) บิดา/มารดา
 - (2) สามี/ภรรยา
 - (3) บุตร
 - (4) พี่/น้อง
 - (5) ญาติใกล้ชิด.....(ระบุ)
 - (6) อาสา / รับจ้าง เป็นผู้ดูแล
9. ระยะเวลาที่ดูแลผู้ป่วยเดือน.....ปี

II ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

1. เพศ

(1) ชาย

(2) หญิง

2. อายุ.....ปี

3. ระยะเวลาที่ป่วย.....(ระบุจำนวนเดือนหรือจำนวนปี)

4. แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นโรค.....

5. ระดับความรุนแรงของผู้ป่วย คือ (จากแบบประเมินภาคผนวกหน้า 54)

(1) ปฏิบัติได้เองปานกลาง

(2) ปฏิบัติได้น้อย

(3) ไม่สามารถปฏิบัติได้เอง



ส่วนที่ 2 แบบสอบถาม
ความต้องการของผู้ดูแลด้านดูแลของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

คำชี้แจง ในฐานะที่ท่านเป็นผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่บ้าน ท่านต้องการให้พยาบาล สอน แนะนำ หรือฝึกทักษะการช่วยเหลือเรื่องใดบ้าง เพื่อจะได้นำไปใช้กับผู้ป่วยของท่านที่บ้านได้ โดยเขียนเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง ต้องการหรือไม่ต้องการ ในแต่ละข้อให้ครบทุกข้อ

ข้อ	ข้อความ	ต้องการ	ไม่ต้องการ
1	ความต้องการตามความจำเป็นขั้นพื้นฐาน การทำทางเดินหายใจให้โล่งเพื่อป้องกันการเกิดปอดบวม		
2	การเลือกชนิดและปริมาณอาหารที่ควรรับประทาน		
3	การป้องกันการสำลักอาหาร		
4	การจัดเตรียมหรือตัดแปลงอุปกรณ์ในการรับประทานอาหารหรือให้อาหารทางสายยางผ่านจมูก		
5	การให้น้ำอย่างถูกต้องและเพียงพอ		
6	การส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ		
7	การดูแลเพื่อป้องกันการอาการท้องผูก		
8	การดูแลหลังขั้วถ่ายอุจจาระ		
9	การดูแลหลังขั้วถ่ายปัสสาวะหรือการดูแลผู้ที่คาสายสวนปัสสาวะ		
10	การสังเกตลักษณะของปัสสาวะ เพื่อเป็นการประเมินการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ		
11	การดูแลให้ได้รับการพักผ่อนและนอนหลับที่เพียงพอ		
12	การดูแลจัดท่านอนไม่ให้เกิดแผลกดทับ		
13	วิธีการออกกำลังกายอย่างเหมาะสมบนเตียง		
14	การส่งเสริมให้สามารถทำกิจกรรมต่างๆ ได้ตามความเหมาะสมกับสภาพร่างกาย		

ข้อ	ข้อความ	ต้องการ	ไม่ต้องการ
15	การมีส่วนร่วมของสมาชิกในครอบครัวในการดูแลและช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพ		
16	การส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมในครอบครัวหรือชุมชน		
17	การดูแลเพื่อป้องกันโรคแทรกซ้อนและอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น		
18	การจัดสิ่งแวดล้อมภายในบ้านเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ		
19	การสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจหรือให้กำลังใจ		
	ความต้องการเมื่อผู้ถูกดูแลมีภาวะเบี่ยงเบนทางสุขภาพ		
1	การทราบแหล่งประโยชน์ในชุมชนที่สามารถให้การช่วยเหลือผู้ป่วย		
2	ความรู้ในการดูแลผู้ป่วยเกี่ยวกับการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน		
3	ผลกระทบของโรคหลอดเลือดสมองที่มีผลต่อร่างกายของผู้ป่วย		
4	การดูแลให้ผู้ป่วยได้รับยาและการรักษาอย่างต่อเนื่อง		
5	การดูแลเพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ำของโรค		
6	การสังเกตอาการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย		
7	การสังเกตอารมณ์และความรู้สึของผู้ป่วย		
8	การจัดการผู้ป่วยเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์		
9	การดูแลการสระผมหรือดูแลให้ผู้ป่วยสระผมอย่างเหมาะสม		
10	การทำหรือดูแลให้ผู้ป่วยทำความสะอาดปากและฟัน		

ข้อ	ข้อความ	ต้องการ	ไม่ต้องการ
11	การดูแลอาบน้ำหรือเช็ดตัวให้ผู้ป่วย		
12	การทำหรือดูแลให้ผู้ป่วยทำความสะอาดอวัยวะสืบพันธุ์		
13	วิธีการฝึกให้ผู้ป่วยสามารถสวมใส่เสื้อผ้าด้วยตนเอง		
14	การดูแลจัดทำผู้ป่วยขณะนั่งหรือนอนหรือการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย		
15	การเคลื่อนไหวยืดข้อต่อและการออกกำลังกายกล้ามเนื้อแก่ผู้ป่วย		
16	การดูแลพลิกตะแคงตัวเพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับ		
17	การดูแลเมื่อผู้ป่วยมีความเปลี่ยนแปลงของโรคเพิ่มขึ้น		
18	การช่วยเหลือผู้ป่วยเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ		
19	การดูแลเกี่ยวกับการปรับบทบาทให้เหมาะสมกับผู้ป่วย เช่น การมีส่วนร่วมการตัดสินใจหรือแก้ปัญหาภายในบ้าน		
20	วิธีการส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยกับเพื่อนบ้าน		
21	ส่งเสริมให้ผู้ป่วยได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา เช่น สวดมนต์ ไหว้พระ ตักบาตร		

ส่วนที่ 3 การแสดงความคิดเห็น

ขณะที่ท่านดูแลผู้ป่วยอยู่ที่บ้านท่านมีปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยด้านใดบ้าง และมีความต้องการการดูแลด้านใดเพิ่มเติม

โปรดระบุ.....

ภาคผนวก ข ตารางความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ดูแลผู้ป่วยกับความ
ต้องการด้านการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่บ้าน จำแนกตามความจำเป็น
ขั้นพื้นฐานและเมื่อมีภาวะเป็ยเบนทางสุขภาพในรายข้อ

ตาราง 8 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านเพศของผู้ดูแลผู้ป่วยกับความต้องการด้าน
การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่บ้าน จำแนกตามความจำเป็นขั้นพื้นฐานใน
รายข้อ (n = 213)

ข้อที่	ความต้องการ	χ^2 -test	p-value
1	การทำทางเดินหายใจให้โล่งเพื่อป้องกันการเกิดปอดบวม	.51	.47
2	การเลือกชนิดและปริมาณอาหารที่ควรรับประทาน	.01	.93
3	การป้องกันการสำลักอาหาร	.91	.34
4	การจัดเตรียมอาหารหรือดัดแปลงอุปกรณ์ในการรับประทานอาหาร หรือให้อาหารทางสายยางผ่านจมูก	.05	.82
5	การให้น้ำอย่างถูกต้องและเพียงพอ	.09	.76
6	การส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ	.01	.90
7	การดูแลเพื่อป้องกันการท้องผูก	.23	.63
8	การดูแลหลังขับถ่ายอุจจาระ	.06	.80
9	การดูแลหลังขับถ่ายปัสสาวะหรือการดูแลผู้ที่ใส่สายสวนปัสสาวะ	.91	.34
10	การสังเกตลักษณะของปัสสาวะ เพื่อเป็นการประเมินการติดเชื้อใน ระบบทางเดินปัสสาวะ	.18	.67
11	การดูแลให้ได้รับการพักผ่อนและนอนหลับที่เพียงพอ	.02	.89
12	การดูแลจัดท่านอนไม่ให้เกิดแผลกดทับ	.30	.58
13	วิธีการออกกำลังกายอย่างเหมาะสมบนเตียง	.23	.63
14	การส่งเสริมให้สามารถทำกิจกรรมต่างๆ ได้ตามความเหมาะสมกับ สภาพร่างกาย	.01	.98
15	การมีส่วนร่วมของสมาชิกในครอบครัวในการดูแลและช่วยฟื้นฟู สมรรถภาพ	.29	.59
16	การส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมในครอบครัวหรือชุมชน	.01	.92
17	การดูแลเพื่อป้องกันโรคแทรกซ้อนและอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น	1.55	.21
18	การจัดสิ่งแวดล้อมภายในบ้านเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ	.21	.64
19	การสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจหรือให้กำลังใจ	.01	.93

* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ตาราง 9 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านเพศของผู้ดูแลผู้ป่วยกับความต้องการด้านการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่บ้าน จำแนกตามความต้องการเมื่อมีภาวะเบี่ยงเบนทางสุขภาพ ในรายชื่อ (n = 213)

ข้อที่	ความต้องการ	χ^2 -test	p-value
1	การทราบแหล่งประโยชน์ในชุมชนที่สามารถให้การช่วยเหลือผู้ป่วย	.01	.94
2	ความรู้ในการดูแลผู้ป่วยเกี่ยวกับการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน	.80	.37
3	ผลกระทบของโรคหลอดเลือดสมองที่มีผลต่อร่างกายของผู้ป่วย	1.79	.18
4	การดูแลให้ผู้ป่วยได้รับยาและการรักษาอย่างต่อเนื่อง	.01	.92
5	การดูแลเพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ำของโรค	.03	.84
6	การสังเกตอาการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย	.87	.35
7	การสังเกตอารมณ์และความรู้สึกของผู้ป่วย	.43	.51
8	การจัดการผู้ป่วยเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์	.79	.37
9	การดูแลการสระผมหรือดูแลให้ผู้ป่วยสระผมอย่างเหมาะสม	.10	.74
10	การทำหรือดูแลให้ผู้ป่วยทำความสะอาดปากและฟัน	.20	.65
11	การดูแลอาบน้ำหรือเช็ดตัวให้ผู้ป่วย	.25	.61
12	การทำหรือดูแลให้ผู้ป่วยทำความสะอาดอวัยวะสืบพันธุ์	.12	.73
13	วิธีการฝึกให้ผู้ป่วยสามารถสวมใส่เสื้อผ้าด้วยตนเอง	.36	.55
14	การดูแลจัดทำผู้ป่วยขณะนั่งหรือนอนหรือการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย	1.22	.27
15	การเคลื่อนไหวข้อต่อและการออกกำลังกายแก้อาการของผู้ป่วย	.17	.68
16	การดูแลพลิกตะแคงตัวเพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับ	.07	.78
17	การดูแลเมื่อผู้ป่วยมีความเปลี่ยนแปลงของโรคเพิ่มขึ้น	.01	.94
18	การช่วยเหลือผู้ป่วยเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ	.01	.92
19	การดูแลเกี่ยวกับการปรับบทบาทให้เหมาะสมกับผู้ป่วย เช่น การมีส่วนร่วมการตัดสินใจหรือแก้ปัญหาภายในบ้าน	1.57	.21
20	วิธีการส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยกับเพื่อนบ้าน	.77	.38
21	ส่งเสริมให้ผู้ป่วยได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา เช่น สวดมนต์ ไหว้พระ ตักบาตร	.33	.56

* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ตาราง 10 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านอายุของผู้ดูแลผู้ป่วยกับความต้องการด้านการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่บ้าน จำแนกตามความจำเป็นขั้นพื้นฐาน ในรายข้อ (n = 213)

ข้อที่	ความต้องการ	χ^2 -test	p-value
1	การทำทางเดินหายใจให้โล่งเพื่อป้องกันการเกิดปอดบวม	7.36	.12
2	การเลือกชนิดและปริมาณอาหารที่ควรรับประทาน	3.14	.53
3	การป้องกันการสำลักอาหาร	6.17	.19
4	การจัดเตรียมหรือดัดแปลงอุปกรณ์ในการรับประทานหรือให้อาหารทางสายยางผ่านจมูก	8.57	.07
5	การให้น้ำอย่างถูกต้องและเพียงพอ	2.09	.72
6	การส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ	2.43	.66
7	การดูแลเพื่อป้องกันการอาการท้องผูก	10.09	.04*
8	การดูแลหลังขับถ่ายอุจจาระ	5.39	.25
9	การดูแลหลังขับถ่ายปัสสาวะหรือการดูแลที่คาสายสวนปัสสาวะ	4.68	.32
10	การสังเกตลักษณะของปัสสาวะ เพื่อเป็นการประเมินการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ	10.37	.04*
11	การดูแลให้ได้รับการพักผ่อนและนอนหลับที่เพียงพอ	1.77	.78
12	การดูแลจัดท่านอนไม่ให้เกิดแผลกดทับ	4.68	.32
13	วิธีการออกกำลังกายอย่างเหมาะสมบนเตียง	3.22	.52
14	การส่งเสริมให้สามารถทำกิจกรรมต่างๆ ได้ตามความเหมาะสมกับสภาพร่างกาย	6.22	.18
15	การมีส่วนร่วมของสมาชิกในครอบครัวในการดูแลและช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพ	5.82	.21
16	การส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมในครอบครัวหรือชุมชน	3.49	.48
17	การดูแลเพื่อป้องกันโรคแทรกซ้อนและอันตรายที่อาจเกิดขึ้น	9.51	.05*
18	การจัดสิ่งแวดล้อมภายในบ้านเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ	2.32	.68
19	การสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจหรือให้กำลังใจ	7.51	.11

* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ตาราง 11 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านอายุของผู้ดูแลกับความต้องการด้านการดูแลผู้ป่วยกับโรคหลอดเลือดสมองที่บ้าน จำแนกตามความต้องการเมื่อมีภาวะเบี่ยงเบนทางสุขภาพ ในรายข้อ (n = 213)

ข้อที่	ความต้องการ	χ^2 -test	p-value
1	การทราบแหล่งประโยชน์ในชุมชนที่สามารถให้การช่วยเหลือผู้ป่วย	7.66	.11
2	ความรู้ในการดูแลผู้ป่วยเกี่ยวกับการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน	5.16	.27
3	ผลกระทบของโรคหลอดเลือดสมองที่มีผลต่อร่างกายของผู้ป่วย	11.61	.02*
4	การดูแลให้ผู้ป่วยได้รับยาและการรักษาอย่างต่อเนื่อง	3.71	.48
5	การดูแลเพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ำของโรค	5.09	.28
6	การสังเกตอาการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย	7.49	.11
7	การสังเกตอารมณ์และความรู้สึกของผู้ป่วย	5.69	.22
8	การจัดการผู้ป่วยเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์	7.25	.12
9	การดูแลการสระผมหรือดูแลให้ผู้ป่วยสระผมอย่างเหมาะสม	5.93	.20
10	การทำหรือดูแลให้ผู้ป่วยทำความสะอาดปากและฟัน	5.75	.22
11	การดูแลอาบน้ำหรือเช็ดตัวให้ผู้ป่วย	6.77	.15
12	การทำหรือดูแลให้ผู้ป่วยทำความสะอาดอวัยวะสืบพันธุ์	3.77	.44
13	วิธีการฝึกให้ผู้ป่วยสามารถสวมใส่เสื้อผ้าด้วยตนเอง	4.43	.35
14	การดูแลจัดทำผู้ป่วยขณะนั่งหรือนอนหรือการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย	2.69	.61
15	การเคลื่อนไหวข้อต่อและการออกกำลังกายกล้ามเนื้อผู้ป่วย	5.20	.27
16	การดูแลพลิกตะแคงตัวเพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับ	.99	.91
17	การดูแลเมื่อผู้ป่วยมีความเปลี่ยนแปลงของโรคเพิ่มขึ้น	10.41	.03*
18	การช่วยเหลือผู้ป่วยเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ	3.43	.49
19	การดูแลเกี่ยวกับการปรับบทบาทให้เหมาะสมกับผู้ป่วย เช่น การมีส่วนร่วมการตัดสินใจหรือแก้ปัญหาภายในบ้าน	2.74	.60
20	วิธีการส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยกับเพื่อนบ้าน	2.08	.72
21	ส่งเสริมให้ผู้ป่วยได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา เช่น สวดมนต์ ไหว้พระ ตักบาตร	3.01	.56

* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ตาราง 12 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านสถานภาพสมรสของผู้ดูแลผู้ป่วยกับความ ต้องการด้านการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่บ้าน จำแนกตามความ จำเป็นขั้นพื้นฐาน ในรายชื่อ (n = 213)

ข้อที่	ความต้องการ	χ^2 -test	p-value
1	การทำทางเดินหายใจให้โล่งเพื่อป้องกันการเกิดปอดบวม	3.30	.19
2	การเลือกชนิดและปริมาณอาหารที่ควรรับประทาน	2.94	.23
3	การป้องกันการสำลักอาหาร	.48	.79
4	การจัดเตรียมหรือดัดแปลงอุปกรณ์ในการรับประทานหรือให้อาหารทางสายยางผ่านจมูก	.62	.73
5	การให้น้ำอย่างถูกต้องและเพียงพอ	.13	.94
6	การส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ	3.31	.19
7	การดูแลเพื่อป้องกันอาการท้องผูก	.38	.83
8	การดูแลหลังขับถ่ายอุจจาระ	1.48	.48
9	การดูแลหลังขับถ่ายปัสสาวะหรือการดูแลผู้ที่คาสายสวนปัสสาวะ	1.63	.44
10	การสังเกตลักษณะของปัสสาวะ เพื่อเป็นการประเมินการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ	1.62	.45
11	การดูแลให้ได้รับการพักผ่อนและนอนหลับที่เพียงพอ	.89	.64
12	การดูแลจัดท่านอนไม่ให้เกิดแผลกดทับ	7.52	.02*
13	วิธีการออกกำลังกายอย่างเหมาะสมบนเตียง	5.95	.05*
14	การส่งเสริมให้สามารถทำกิจกรรมต่างๆ ได้ตามความเหมาะสมกับสภาพร่างกาย	3.11	.21
15	การมีส่วนร่วมของสมาชิกในครอบครัวในการดูแลและช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพ	.66	.72
16	การส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมในครอบครัวหรือชุมชน	1.27	.53
17	การดูแลเพื่อป้องกันโรคแทรกซ้อนและอันตรายที่อาจเกิดขึ้น	1.15	.56
18	การจัดสิ่งแวดล้อมภายในบ้านเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ	3.61	.16
19	การสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจหรือให้กำลังใจ	3.19	.20

* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ตาราง 13 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านสถานภาพสมรสของผู้ดูแลผู้ป่วยกับความต้องการ ด้านการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่บ้านจำแนกตามความต้องการเมื่อมีภาวะเป็ยงเบนทางสุขภาพ ในรายข้อ (n = 213)

ข้อที่	ความต้องการ	χ^2 -test	p-value
1	การทราบแหล่งประโยชน์ในชุมชนที่สามารถให้การช่วยเหลือผู้ป่วย	2.04	.36
2	ความรู้ในการดูแลผู้ป่วยเกี่ยวกับด้านการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน	2.29	.32
3	ผลกระทบของโรคหลอดเลือดสมองที่มีผลต่อร่างกายของผู้ป่วย	.13	.94
4	การดูแลให้ผู้ป่วยได้รับยาและการรักษาอย่างต่อเนื่อง	.28	.87
5	การดูแลเพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ำของโรค	1.86	.39
6	การสังเกตอาการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย	.52	.77
7	การสังเกตอารมณ์และความรู้สึกของผู้ป่วย	3.14	.21
8	การจัดการผู้ป่วยเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์	.46	.79
9	การดูแลการสระผมหรือดูแลให้ผู้ป่วยสระผมอย่างเหมาะสม	2.62	.27
10	การทำหรือดูแลให้ผู้ป่วยทำความสะอาดปากและฟัน	2.14	.34
11	การดูแลอาบน้ำหรือเช็ดตัวให้ผู้ป่วย	4.25	.12
12	การทำหรือดูแลให้ผู้ป่วยทำความสะอาดอวัยวะสืบพันธุ์	7.49	.02*
13	วิธีการฝึกให้ผู้ป่วยสามารถสวมใส่เสื้อผ้าด้วยตนเอง	4.31	.12
14	การดูแลจัดทำผู้ป่วยขณะนั่งหรือนอนหรือการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย	.85	.65
15	การเคลื่อนไหวข้อต่อและการออกกำลังกายกล้ามเนื้อแก่ผู้ป่วย	1.71	.43
16	การดูแลพลิกตะแคงตัวเพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับ	.76	.68
17	การดูแลเมื่อผู้ป่วยมีความเปลี่ยนแปลงของโรคเพิ่มขึ้น	.61	.74
18	การช่วยเหลือผู้ป่วยเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ	2.70	.26
19	การดูแลเกี่ยวกับการปรับบทบาทให้เหมาะสมกับผู้ป่วย เช่น การมีส่วนร่วมการตัดสินใจหรือแก้ปัญหาภายในบ้าน	2.36	.31
20	วิธีการส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยกับเพื่อนบ้าน	1.62	.45
21	ส่งเสริมให้ผู้ป่วยได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา เช่น สวดมนต์ ไหว้พระ ตักบาตร	2.84	.24

* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ตาราง 14 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านอาชีพของผู้ดูแลผู้ป่วยกับความต้องการด้านการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่บ้าน จำแนกตามความจำเป็นขั้นพื้นฐาน ในรายข้อ (n = 213)

ข้อที่	ความต้องการ	χ^2 -test	p-value
1	การทำทางเดินหายใจให้โล่งเพื่อป้องกันการเกิดปอดบวม	.48	.92
2	การเลือกชนิดและปริมาณอาหารที่ควรรับประทาน	2.52	.47
3	การป้องกันการสำลักอาหาร	3.22	.36
4	การจัดเตรียมหรือดัดแปลงอุปกรณ์ในการรับประทานอาหารหรือให้อาหารทางสายยางผ่านจมูก	3.16	.37
5	การให้น้ำอย่างถูกต้องและเพียงพอ	1.28	.73
6	การส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ	.76	.86
7	การดูแลเพื่อป้องกันการอาการท้องผูก	7.07	.07
8	การดูแลหลังขั้วถ่ายอุจจาระ	3.41	.33
9	การดูแลหลังขั้วถ่ายปัสสาวะหรือการดูแลผู้ที่คาสายสวนปัสสาวะ	5.39	.14
10	การสังเกตลักษณะของปัสสาวะ เพื่อเป็นการประเมินการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ	3.39	.33
11	การดูแลให้ได้รับการพักผ่อนและนอนหลับที่เพียงพอ	1.27	.74
12	การดูแลจัดท่านอนไม่ให้เกิดแผลกดทับ	2.64	.45
13	วิธีการออกกำลังกายอย่างเหมาะสมบนเตียง	4.07	.25
14	การส่งเสริมให้สามารถทำกิจกรรมต่างๆ ได้ตามความเหมาะสมกับสภาพร่างกาย	1.33	.72
15	การมีส่วนร่วมของสมาชิกในครอบครัวในการดูแลและช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพ	.59	.89
16	การส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมในครอบครัวหรือชุมชน	.23	.97
17	การดูแลเพื่อป้องกันการโรคแทรกซ้อนและอันตรายที่อาจเกิดขึ้น	1.01	.79
18	การจัดสิ่งแวดล้อมภายในบ้านเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ	.26	.96
19	การสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจหรือให้กำลังใจ	.04	.99

* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ตาราง 15 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านอาชีพของผู้ดูแลผู้ป่วยกับความต้องการด้านการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่บ้านจำแนกตามความต้องการเมื่อมีภาวะเบี่ยงเบนทางสุขภาพ ในรายข้อ (n = 213)

ข้อที่	ความต้องการ	χ^2 -test	p-value
1	การทราบแหล่งประโยชน์ในชุมชนที่สามารถให้การช่วยเหลือผู้ป่วย	2.98	.39
2	ความรู้ในการดูแลผู้ป่วยเกี่ยวกับการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน	.34	.95
3	ผลกระทบของโรคหลอดเลือดสมองที่มีผลต่อร่างกายของผู้ป่วย	1.66	.65
4	การดูแลให้ผู้ป่วยได้รับยาและการรักษาอย่างต่อเนื่อง	3.87	.27
5	การดูแลเพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ำของโรค	4.55	.21
6	การสังเกตอาการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย	1.51	.76
7	การสังเกตอารมณ์และความรู้สึกของผู้ป่วย	.92	.82
8	การจัดการผู้ป่วยเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์	1.57	.66
9	การดูแลการสระผมหรือดูแลให้ผู้ป่วยสระผมอย่างเหมาะสม	1.28	.73
10	การทำหรือดูแลให้ผู้ป่วยทำความสะอาดปากและฟัน	2.09	.55
11	การดูแลอาบน้ำหรือเช็ดตัวให้ผู้ป่วย	4.57	.21
12	การทำหรือดูแลให้ผู้ป่วยทำความสะอาดอวัยวะสืบพันธุ์	3.09	.38
13	วิธีการฝึกให้ผู้ป่วยสามารถสวมใส่เสื้อผ้าด้วยตนเอง	1.05	.79
14	การดูแลจัดทำผู้ป่วยขณะนั่งหรือนอนหรือการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย	1.19	.75
15	การเคลื่อนไหวข้อต่อและการออกกำลังกายกล้ามเนื้อแก่ผู้ป่วย	2.32	.51
16	การดูแลพลิกตะแคงตัวเพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับ	1.11	.77
17	การดูแลเมื่อผู้ป่วยมีความเปลี่ยนแปลงของโรคเพิ่มขึ้น	2.22	.53
18	การช่วยเหลือผู้ป่วยเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ	1.16	.76
19	การดูแลเกี่ยวกับการปรับบทบาทให้เหมาะสมกับผู้ป่วย เช่น การมีส่วนร่วมการตัดสินใจหรือแก้ปัญหาภายในบ้าน	1.55	.67
20	วิธีการส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยกับเพื่อนบ้าน	2.01	.57
21	ส่งเสริมให้ผู้ป่วยได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา เช่น สวดมนต์ ไหว้พระ ตักบาตร	2.33	.51

* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ตาราง 16 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการศึกษาของผู้ป่วยกับความ
ต้องการด้านการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่บ้าน จำแนกตามความจำเป็น
ขั้นพื้นฐานในรายชื่อ (n = 213)

ข้อที่	ความต้องการ	χ^2 -test	p-value
1	การทำทางเดินหายใจให้โล่งเพื่อป้องกันการเกิดปอดบวม	8.49	.08
2	การเลือกชนิดและปริมาณอาหารที่ควรรับประทาน	5.160	.27
3	การป้องกันการสำลักอาหาร	4.99	.29
4	การจัดเตรียมหรือดัดแปลงอุปกรณ์ในการรับประทานอาหารหรือให้ อาหารทางสายยางผ่านจมูก	8.94	.06
5	การให้น้ำอย่างถูกต้องและเพียงพอ	7.09	.13
6	การส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ	4.03	.40
7	การดูแลเพื่อป้องกันการท้องผูก	2.83	.59
8	การดูแลหลังขับถ่ายอุจจาระ	3.82	.43
9	การดูแลหลังขับถ่ายปัสสาวะหรือการดูแลผู้ที่คาสายสวนปัสสาวะ	9.33	.05*
10	การสังเกตลักษณะของปัสสาวะ เพื่อเป็นการประเมินการติดเชื้อใน ระบบทางเดินปัสสาวะ	7.73	.10
11	การดูแลให้ได้รับการพักผ่อนและนอนหลับที่เพียงพอ	1.01	.91
12	การดูแลจัดท่านอนไม่ให้เกิดแผลกดทับ	1.95	.75
13	วิธีการออกกำลังกายอย่างเหมาะสมบนเตียง	2.69	.61
14	การส่งเสริมให้สามารถทำกิจกรรมต่างๆ ได้ตามความเหมาะสมกับ สภาพร่างกาย	6.00	1.19
15	การมีส่วนร่วมของสมาชิกในครอบครัวในการดูแลและช่วยฟื้นฟู สมรรถภาพ	3.97	.41
16	การส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมในครอบครัวหรือชุมชน	5.93	.21
17	การดูแลเพื่อป้องกันการโรคแทรกซ้อนและอันตรายที่อาจเกิดขึ้น	3.67	.45
18	การจัดสิ่งแวดล้อมภายในบ้านเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ	2.18	.70
19	การสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจหรือให้กำลังใจ	5.73	.22

* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ตาราง 17 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการศึกษาของผู้ดูแลผู้ป่วยกับความ
ต้องการด้านการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่บ้าน จำแนกตามความ
ต้องการเมื่อมีภาวะเป็ียงเบนทางสุขภาพ ในรายข้อ (n = 213)

ข้อที่	ความต้องการ	χ^2 -test	p-value
1	การทราบแหล่งประโยชน์ในชุมชนที่สามารถให้การช่วยเหลือผู้ป่วย	7.84	.09
2	ความรู้ในการดูแลผู้ป่วยเกี่ยวกับการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน	2.54	.64
3	ผลกระทบของโรคหลอดเลือดสมองที่มีผลต่อร่างกายของผู้ป่วย	6.12	.19
4	การดูแลให้ผู้ป่วยได้รับยาและการรักษาอย่างต่อเนื่อง	6.34	.18
5	การดูแลเพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ำของโรค	5.72	.22
6	การสังเกตอาการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย	9.99	.04*
7	การสังเกตอารมณ์และความรู้สึกของผู้ป่วย	9.31	.05*
8	การจัดการผู้ป่วยเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์	11.23	.02*
9	การดูแลการสระผมหรือดูแลให้ผู้ป่วยสระผมอย่างเหมาะสม	4.77	.31
10	การทำหรือดูแลให้ผู้ป่วยทำความสะอาดปากและฟัน	4.29	.37
11	การดูแลอาบน้ำหรือเช็ดตัวให้ผู้ป่วย	6.17	.19
12	การทำหรือดูแลให้ผู้ป่วยทำความสะอาดอวัยวะสืบพันธุ์	1.22	.87
13	วิธีการฝึกให้ผู้ป่วยสามารถสวมใส่เสื้อผ้าด้วยตนเอง	2.89	.58
14	การดูแลจัดทำผู้ป่วยขณะนั่งหรือนอนหรือการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย	5.08	.28
15	การเคลื่อนไหวข้อต่อและการออกกำลังกายกล้ามเนื้อแก่ผู้ป่วย	6.08	.19
16	การดูแลพลิกตะแคงตัวเพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับ	8.37	.08
17	การดูแลเมื่อผู้ป่วยมีความเปลี่ยนแปลงของโรคเพิ่มขึ้น	8.69	.07
18	การช่วยเหลือผู้ป่วยเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ	3.33	.50
19	การดูแลเกี่ยวกับการปรับบทบาทให้เหมาะสมกับผู้ป่วย เช่น การมีส่วนร่วมการตัดสินใจหรือแก้ปัญหาภายในบ้าน	3.75	.44
20	วิธีการส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยกับเพื่อนบ้าน	4.47	.35
21	ส่งเสริมให้ผู้ป่วยได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา เช่น สวดมนต์ ไหว้พระ ตักบาตร	3.37	.49

* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ตาราง 18 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านรายได้ของผู้ดูแลผู้ป่วยกับความต้องการด้านการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่บ้าน จำแนกตามความจำเป็นขั้นพื้นฐานในรายชื่อ (n = 213)

ข้อที่	ความต้องการ	χ^2 -test	p-value
1	การทำทางเดินหายใจให้โล่งเพื่อป้องกันการเกิดปอดบวม	3.42	.33
2	การเลือกชนิดและปริมาณอาหารที่ควรรับประทาน	.69	.88
3	การป้องกันการสำลักอาหาร	1.02	.79
4	การจัดเตรียมหรือดัดแปลงอุปกรณ์ในการรับประทานอาหารหรือให้อาหารทางสายยางผ่านจมูก	3.47	.33
5	การให้น้ำอย่างถูกต้องและเพียงพอ	3.48	.32
6	การส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ	1.98	.58
7	การดูแลเพื่อป้องกันการท้องผูก	3.12	.37
8	การดูแลหลังขั้วถ่ายอุจจาระ	3.07	.38
9	การดูแลหลังขั้วถ่ายปัสสาวะหรือการดูแลผู้ที่คาสายสวนปัสสาวะ	2.85	.42
10	การสังเกตลักษณะของปัสสาวะ เพื่อเป็นการประเมินการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ	1.74	.63
11	การดูแลให้ได้รับการพักผ่อนและนอนหลับที่เพียงพอ	4.31	.23
12	การดูแลจัดท่านอนไม่ให้เกิดแผลกดทับ	3.61	.31
13	วิธีการออกกำลังกายอย่างเหมาะสมบนเตียง	2.66	.45
14	การส่งเสริมให้สามารถทำกิจกรรมต่างๆ ได้ตามความเหมาะสมกับสภาพร่างกาย	1.90	.59
15	การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกในครอบครัวในการดูแลและช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพ	1.32	.72
16	การส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมในครอบครัวหรือชุมชน	.41	.94
17	การดูแลเพื่อป้องกันการโรคแทรกซ้อนและอันตรายที่อาจเกิดขึ้น	.76	.86
18	การจัดสิ่งแวดล้อมภายในบ้านเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ	4.67	.19
19	การสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจหรือให้กำลังใจ	1.25	.74

* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ตาราง 19 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านรายได้ของผู้ดูแลผู้ป่วยกับความต้องการด้านการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่บ้าน จำแนกตามความต้องการเมื่อมีภาวะเบี่ยงเบนทางสุขภาพ ในรายข้อ (n = 213)

ข้อที่	ความต้องการ	χ^2 -test	p-value
1	การทราบแหล่งประโยชน์ในชุมชนที่สามารถให้การช่วยเหลือผู้ป่วย	7.16	.07
2	ความรู้ในการดูแลผู้ป่วยเกี่ยวกับการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน	2.14	.54
3	ผลกระทบของโรคหลอดเลือดสมองที่มีผลต่อร่างกายของผู้ป่วย	8.02	.05*
4	การดูแลให้ผู้ป่วยได้รับยาและการรักษาอย่างต่อเนื่อง	2.17	.54
5	การดูแลเพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ำของโรค	2.34	.51
6	การสังเกตอาการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย	4.72	.19
7	การสังเกตอารมณ์และความรู้สึกของผู้ป่วย	4.89	.18
8	การจัดการผู้ป่วยเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์	4.21	.24
9	การดูแลการสระผมหรือดูแลให้ผู้ป่วยสระผมอย่างเหมาะสม	2.42	.49
10	การทำหรือดูแลให้ผู้ป่วยทำความสะอาดปากและฟัน	1.02	.79
11	การดูแลอาบน้ำหรือเช็ดตัวให้ผู้ป่วย	3.14	.37
12	การทำหรือดูแลให้ผู้ป่วยทำความสะอาดอวัยวะสืบพันธุ์	3.48	.32
13	วิธีการฝึกให้ผู้ป่วยสามารถสวมใส่เสื้อผ้าด้วยตนเอง	3.45	.33
14	การดูแลจัดทำผู้ป่วยขณะนั่งหรือนอนหรือการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย	.49	.92
15	การเคลื่อนไหวข้อต่อและการออกกำลังกายกล้ามเนื้อแก่ผู้ป่วย	1.34	.72
16	การดูแลพลิกตะแคงตัวเพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับ	1.05	.79
17	การดูแลเมื่อผู้ป่วยมีความเปลี่ยนแปลงของโรคเพิ่มขึ้น	4.84	.18
18	การช่วยเหลือผู้ป่วยเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ	1.65	.65
19	การดูแลเกี่ยวกับการปรับบทบาทให้เหมาะสมกับผู้ป่วย เช่น การมีส่วนร่วมการตัดสินใจหรือแก้ปัญหาภายในบ้าน	1.55	.67
20	วิธีการส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยกับเพื่อนบ้าน	3.48	.32
21	ส่งเสริมให้ผู้ป่วยได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา เช่น สวดมนต์ ไหว้พระ ตักบาตร	1.69	.64

* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ตาราง 20 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านระยะเวลาการดูแลของผู้ดูแลผู้ป่วยกับความ
ต้องการด้านการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่บ้านจำแนกตามความจำเป็น
ขั้นพื้นฐาน ในรายข้อ (n = 213)

ข้อที่	ความต้องการ	χ^2 -test	p-value
1	การทำทางเดินหายใจให้โล่งเพื่อป้องกันการเกิดปอดบวม	1.19	.87
2	การเลือกชนิดและปริมาณอาหารที่ควรรับประทาน	2.02	.73
3	การป้องกันการสำลักอาหาร	1.97	.74
4	การจัดเตรียมหรือดัดแปลงอุปกรณ์ในการรับประทานอาหารหรือให้อาหารทางสายยางผ่านจมูก	1.05	.90
5	การให้น้ำอย่างถูกต้องและเพียงพอ	1.16	.89
6	การส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ	3.91	.42
7	การดูแลเพื่อป้องกันการอาการท้องผูก	2.02	.73
8	การดูแลหลังขับถ่ายอุจจาระ	1.01	.91
9	การดูแลหลังขับถ่ายปัสสาวะหรือการดูแลผู้ที่คาสายสวนปัสสาวะ	8.79	.07
10	การสังเกตลักษณะของปัสสาวะ เพื่อเป็นการประเมินการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ	1.87	.76
11	การดูแลให้ได้รับการพักผ่อนและนอนหลับที่เพียงพอ	3.32	.51
12	การดูแลจัดท่านอนไม่เกิดแผลกดทับ	6.06	.19
13	วิธีการออกกำลังกายอย่างเหมาะสมบนเตียง	2.55	.64
14	การส่งเสริมให้สามารถทำกิจกรรมต่างๆ ได้ตามความเหมาะสมกับสภาพร่างกาย	5.86	.21
15	การมีส่วนร่วมของสมาชิกในครอบครัวในการดูแลและช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพ	3.79	.44
16	การส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมในครอบครัวหรือชุมชน	6.01	.19
17	การดูแลเพื่อป้องกันการโรคแทรกซ้อนและอันตรายที่อาจเกิดขึ้น	3.33	.50
18	การจัดสิ่งแวดล้อมภายในบ้านเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ	3.25	.52
19	การสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจหรือให้กำลังใจ	8.63	.07

* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ตาราง 21 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านระยะเวลาการดูแลของผู้ดูแลผู้ป่วยกับความต้องการ ด้านการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่บ้านจำแนกตามความต้องการเมื่อมีภาวะเบี่ยงเบนทางสุขภาพ ในรายข้อ (n = 213)

ข้อที่	ความต้องการ	χ^2 -test	p-value
1	การทราบแหล่งประโยชน์ในชุมชนที่สามารถให้การช่วยเหลือผู้ป่วย	4.29	.37
2	ความรู้ในการดูแลผู้ป่วยเกี่ยวกับการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน	11.32	.02*
3	ผลกระทบของโรคหลอดเลือดสมองที่มีผลต่อร่างกายของผู้ป่วย	2.13	.71
4	การดูแลให้ผู้ป่วยได้รับยาและการรักษาอย่างต่อเนื่อง	3.24	.52
5	การดูแลเพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ำของโรค	1.46	.84
6	การสังเกตอาการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย	1.57	.81
7	การสังเกตอารมณ์และความรู้สึกของผู้ป่วย	3.66	.45
8	การจัดการผู้ป่วยเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์	5.14	.27
9	การดูแลการระดมหรือดูแลให้ผู้ป่วยระดมอย่างเหมาะสม	3.33	.50
10	การทำหรือดูแลให้ผู้ป่วยทำความสะอาดปากและฟัน	4.63	.33
11	การดูแลอาบน้ำหรือเช็ดตัวให้ผู้ป่วย	4.67	.32
12	การทำหรือดูแลให้ผู้ป่วยทำความสะอาดอวัยวะสืบพันธุ์	4.66	.32
13	วิธีการฝึกให้ผู้ป่วยสามารถสวมใส่เสื้อผ้าด้วยตนเอง	1.17	.88
14	การดูแลจัดทำผู้ป่วยขณะนั่งหรือนอนหรือการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย	8.88	.06
15	การเคลื่อนไหวข้อต่อและการออกกำลังกายกล้ามเนื้อแก่ผู้ป่วย	3.65	.46
16	การดูแลพลิกตะแคงตัวเพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับ	4.09	.39
17	การดูแลเมื่อผู้ป่วยมีความเปลี่ยนแปลงของโรคเพิ่มขึ้น	2.24	.69
18	การช่วยเหลือผู้ป่วยเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ	3.48	.48
19	การดูแลเกี่ยวกับการปรับบทบาทให้เหมาะสมกับผู้ป่วย เช่น การมีส่วนร่วมการตัดสินใจหรือแก้ปัญหาภายในบ้าน	1.81	.77
20	วิธีการส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยกับเพื่อนบ้าน	2.57	.63
21	ส่งเสริมให้ผู้ป่วยได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา เช่น สวดมนต์ ไหว้พระ ตักบาตร	3.84	.43

* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ตาราง 22 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านความสัมพันธ์ของผู้ดูแลผู้ป่วยกับความ
ต้องการด้านการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่บ้านจำแนกตามความจำเป็นชั้น
พื้นฐานในรายชื่อ (n = 213)

ข้อที่	ความต้องการ	χ^2 -test	p-value
1	การทำทางเดินหายใจให้โล่งเพื่อป้องกันการเกิดปอดบวม	4.25	.37
2	การเลือกชนิดและปริมาณอาหารที่ควรรับประทาน	5.38	.25
3	การป้องกันการสำลักอาหาร	2.57	.63
4	การจัดเตรียมหรือดัดแปลงอุปกรณ์ในการรับประทานอาหารหรือให้อาหารทางสายยางผ่านจมูก	2.46	.65
5	การให้น้ำอย่างถูกต้องและเพียงพอ	6.62	.16
6	การส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ	5.18	.27
7	การดูแลเพื่อป้องกันการท้องผูก	2.23	.69
8	การดูแลหลังขับถ่ายอุจจาระ	3.23	.52
9	การดูแลหลังขับถ่ายปัสสาวะหรือการดูแลผู้ที่คาสายสวนปัสสาวะ	6.14	.19
10	การสังเกตลักษณะของปัสสาวะ เพื่อเป็นการประเมินการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ	1.20	.88
11	การดูแลให้ได้รับการพักผ่อนและนอนหลับที่เพียงพอ	9.27	.06
12	การดูแลจัดท่านอนไม่ให้เกิดแผลกดทับ	4.55	.34
13	วิธีการออกกำลังกายอย่างเหมาะสมบนเตียง	2.58	.63
14	การส่งเสริมให้สามารถทำกิจกรรมต่างๆ ได้ตามความเหมาะสมกับสภาพร่างกาย	2.27	.69
15	การมีส่วนร่วมของสมาชิกในครอบครัว ในการดูแลและช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพ	1.85	.76
16	การส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมในครอบครัวหรือชุมชน	2.87	.61
17	การดูแลเพื่อป้องกันการโรคแทรกซ้อนและอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น	7.30	.12
18	การจัดสิ่งแวดล้อมภายในบ้านเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ	7.44	.11
19	การสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจหรือให้กำลังใจ	4.20	.38

* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ตาราง 23 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านความสัมพันธ์ของผู้ดูแลผู้ป่วยกับความ
ต้องการด้านการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่บ้าน จำแนกตามความ
ต้องการเมื่อมีภาวะเบี่ยงเบนทางสุขภาพ ในรายข้อ (n = 213)

ข้อที่	ความต้องการ	χ^2 -test	p-value
1	การทราบแหล่งประโยชน์ในชุมชนที่สามารถให้การช่วยเหลือผู้ป่วย	2.44	.66
2	ความรู้ในการดูแลผู้ป่วยเกี่ยวกับการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน	.54	.97
3	ผลกระทบของโรคหลอดเลือดสมองที่มีผลต่อร่างกายของผู้ป่วย	4.53	.34
4	การดูแลให้ผู้ป่วยได้รับยาและการรักษาอย่างต่อเนื่อง	1.14	.89
5	การดูแลเพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ำของโรค	4.84	.31
6	การสังเกตอาการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย	2.39	.66
7	การสังเกตอารมณ์และความรู้สึกของผู้ป่วย	2.16	.71
8	การจัดการผู้ป่วยเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์	1.27	.87
9	การดูแลการสระผมหรือดูแลให้ผู้ป่วยสระผมอย่างเหมาะสม	2.04	.73
10	การทำหรือดูแลให้ผู้ป่วยทำความสะอาดปากและฟัน	5.78	.22
11	การดูแลอาบน้ำหรือเช็ดตัวให้ผู้ป่วย	6.31	.18
12	การทำหรือดูแลให้ผู้ป่วยทำความสะอาดอวัยวะสืบพันธุ์	4.88	.30
13	วิธีการฝึกให้ผู้ป่วยสามารถสวมใส่เสื้อผ้าด้วยตนเอง	9.38	.05*
14	การดูแลจัดทำผู้ป่วยขณะนั่งหรือนอนหรือการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย	1.51	.82
15	การเคลื่อนไหวข้อต่อและการออกกำลังกายกล้ามเนื้อแก่ผู้ป่วย	1.25	.87
16	การดูแลพลิกตะแคงตัวเพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับ	2.77	.59
17	การดูแลเมื่อผู้ป่วยมีความเปลี่ยนแปลงของโรคเพิ่มขึ้น	1.11	.89
18	การช่วยเหลือผู้ป่วยเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ	3.36	.49
19	การดูแลเกี่ยวกับการปรับบทบาทให้เหมาะสมกับผู้ป่วย เช่น การมีส่วนร่วมการตัดสินใจหรือแก้ปัญหาภายในบ้าน	7.97	0.9
20	วิธีการส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยกับเพื่อนบ้าน	6.80	.15
21	ส่งเสริมให้ผู้ป่วยได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา เช่น สวดมนต์ ไหว้พระ ตักบาตร	11.26	.02*

* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ตาราง 24 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านระยะเวลาการเจ็บป่วยของผู้ดูแลผู้ป่วย
กับความต้องการ ด้านการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่บ้านจำแนกตาม
ความจำเป็นขั้นพื้นฐาน ในรายชื่อ (n = 213)

ข้อที่	ความต้องการ	χ^2 -test	p-value
1	การทำทางเดินหายใจให้โล่งเพื่อป้องกันการเกิดปอดบวม	.54	.97
2	การเลือกชนิดและปริมาณอาหารที่ควรรับประทาน	2.27	.69
3	การป้องกันการสำลักอาหาร	1.09	.89
4	การจัดเตรียมหรือดัดแปลงอุปกรณ์ในการรับประทานอาหารหรือให้อาหารทางสายยางผ่านจมูก	.63	.96
5	การให้น้ำอย่างถูกต้องและเพียงพอ	2.11	.72
6	การส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ	3.97	.41
7	การดูแลเพื่อป้องกันการท้องผูก	2.78	.59
8	การดูแลหลังขับถ่ายอุจจาระ	1.14	.89
9	การดูแลหลังขับถ่ายปัสสาวะหรือการดูแลผู้ที่คาสายสวนปัสสาวะ	7.23	.12
10	การสังเกตลักษณะของปัสสาวะ เพื่อเป็นการประเมินการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ	4.24	.37
11	การดูแลให้ได้รับการพักผ่อนและนอนหลับที่เพียงพอ	4.85	.30
12	การดูแลจัดท่านอนไม่ให้เกิดแผลกดทับ	8.03	.09
13	วิธีการออกกำลังกายอย่างเหมาะสมบนเตียง	6.28	.18
14	การส่งเสริมให้สามารถทำกิจกรรมต่างๆ ได้ตามความเหมาะสมกับสภาพร่างกาย	7.38	.12
15	การมีส่วนร่วมของสมาชิกในครอบครัวในการดูแลและช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพ	4.32	.36
16	การส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมในครอบครัวหรือชุมชน	6.35	.18
17	การดูแลเพื่อป้องกันการโรคแทรกซ้อนและอันตรายที่อาจเกิดขึ้น	2.91	.57
18	การจัดสิ่งแวดล้อมภายในบ้านเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ	4.24	.38
19	การสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจหรือให้กำลังใจ	8.53	.07

* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ตาราง 25 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านระยะเวลาการเจ็บป่วยของผู้ดูแลผู้ป่วย
กับความต้องการ ด้านการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่บ้าน จำแนกตาม
ความต้องการเมื่อมีภาวะเบี่ยงเบนทางสุขภาพ ในรายข้อ (n = 213)

ข้อที่	ความต้องการ	χ^2 -test	p-value
1	การทราบแหล่งประโยชน์ในชุมชนที่สามารถให้การช่วยเหลือผู้ป่วย	7.89	.09
2	ความรู้ในการดูแลผู้ป่วยเกี่ยวกับการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน	11.05	.03*
3	ผลกระทบของโรคหลอดเลือดสมองที่มีผลต่อร่างกายของผู้ป่วย	2.77	.59
4	การดูแลให้ผู้ป่วยได้รับยาและการรักษาอย่างต่อเนื่อง	1.71	.79
5	การดูแลเพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ำของโรค	1.15	.89
6	การสังเกตอาการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย	1.08	.89
7	การสังเกตอารมณ์และความรู้สึกของผู้ป่วย	3.12	.54
8	การจัดการผู้ป่วยเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์	4.29	.37
9	การดูแลการระดมหรือดูแลให้ผู้ป่วยระดมอย่างเหมาะสม	3.72	.45
10	การทำหรือดูแลให้ผู้ป่วยทำความสะอาดปากและฟัน	5.00	.29
11	การดูแลอาบน้ำหรือเช็ดตัวให้ผู้ป่วย	5.15	.27
12	การทำหรือดูแลให้ผู้ป่วยทำความสะอาดอวัยวะสืบพันธุ์	4.79	.31
13	วิธีการฝึกให้ผู้ป่วยสามารถสวมใส่เสื้อผ้าด้วยตนเอง	2.15	.71
14	การดูแลจัดทำผู้ป่วยขณะนั่งหรือนอนหรือการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย	8.63	.07
15	การเคลื่อนไหวข้อต่อและการออกกำลังกายกล้ามเนื้อแก่ผู้ป่วย	5.49	.24
16	การดูแลพลิกตะแคงตัวเพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับ	4.75	.32
17	การดูแลเมื่อผู้ป่วยมีความเปลี่ยนแปลงของโรคเพิ่มขึ้น	3.17	.53
18	การช่วยเหลือผู้ป่วยเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ	4.09	.39
19	การดูแลเกี่ยวกับการปรับบทบาทให้เหมาะสมกับผู้ป่วย เช่น การมีส่วนร่วมการตัดสินใจหรือแก้ปัญหาภายในบ้าน	1.27	.87
20	วิธีการส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยกับเพื่อนบ้าน	2.32	.68
21	ส่งเสริมให้ผู้ป่วยได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา เช่น สวดมนต์ ไหว้พระ ตักบาตร	4.34	.36

* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ภาคผนวก ค ตัวอย่างการคำนวณ

สมมติฐาน

ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ดูแลผู้ป่วย กับความต้องการด้านการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่บ้าน จำแนกตามความจำเป็นขั้นพื้นฐาน ในรายข้อที่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ตาราง 26 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านอายุของผู้ดูแลผู้ป่วยกับความต้องการด้านการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่บ้าน จำแนกตามความจำเป็นขั้นพื้นฐาน ในรายข้อ (n = 213)

ข้อที่	ความต้องการ	χ^2 -test	p-value
1	การทำทางเดินหายใจให้โล่งเพื่อป้องกันการเกิดปอดบวม	7.36	.12
7	การดูแลเพื่อป้องกันการอาการท้องผูก	10.09	.04*

*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ตาราง 27 แสดงการคำนวณข้อที่ 7 (การดูแลเพื่อป้องกันการอาการท้องผูก)

ตัวแปร	ต้องการ		ไม่ต้องการ		รวม		χ^2 -test
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
อายุของผู้ดูแลผู้ป่วย							
21 - 30 ปี	1	0.50	8	3.80	9	4.20	
31 - 40 ปี	17	8.00	13	6.10	30	14.10	
41 - 50 ปี	29	13.60	33	15.50	62	29.10	10.09
51 - 60 ปี	14	6.60	34	16.00	48	22.50	
มากกว่า 60 ปี	28	13.10	36	16.90	64	30.00	
รวม	89	41.80	124	58.20	213	100.00	

ตาราง 28 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านสถานภาพของผู้ดูแลผู้ป่วยกับความ
ต้องการด้านการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่บ้าน จำแนกตามความจำเป็นชั้น
พื้นฐาน ในรายข้อ (n = 213)

ข้อที่	ความต้องการ	χ^2 -test	p-value
1	การทำทางเดินหายใจให้โล่งเพื่อป้องกันการเกิดปอดบวม	3.30	.19
12	การดูแลจัดท่านอนไม่ให้เกิดแผลกดทับ	7.52	.02*

*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ตาราง 29 แสดงการคำนวณข้อที่ 12 (การดูแลจัดท่านอนไม่ให้เกิดแผลกดทับ)

ตัวแปร	ต้องการ		ไม่ต้องการ		รวม		χ^2 - test
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
สถานภาพสมรส							
คู่	83	39.00	77	36.20	160	75.10	7.52*
โสด	10	4.70	13	6.10	23	10.80	
หม้าย/หย่า/แยกกัน	23	10.80	7	3.30	30	14.10	
อยู่							
รวม	116	54.50	124	58.20	213	100.00	

ตาราง 30 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการศึกษาของผู้ดูแลผู้ป่วยกับความ
ต้องการด้านการดูแล ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่บ้าน จำแนกตามความ
จำเป็นขั้นพื้นฐาน ในรายข้อ (n = 213)

ข้อที่	ความต้องการ	χ^2 -test	p-value
1	การทำทางเดินหายใจให้โล่งเพื่อป้องกันการเกิดปอดบวม	8.49	0.8
9	การดูแลหลังขั้วถ่ายปัสสาวะหรือการดูแลผู้ที่คาสายสวน ปัสสาวะ	9.33	.05*

*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ตาราง 31 แสดงการคำนวณข้อที่ 9 (การดูแลหลังขั้วถ่ายปัสสาวะหรือการดูแลผู้ที่คาสายสวน
ปัสสาวะ)

ตัวแปร	ต้องการ		ไม่ต้องการ		รวม		χ^2 - test
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
ระดับการศึกษา							
ประถมศึกษา	108	50.70	59	27.70	167	78.40	
มัธยมศึกษา	10	4.70	5	2.30	15	7.00	
อนุปริญญา	5	2.30	1	0.50	6	2.80	9.33*
ปริญญาตรี	2	0.90	8	3.80	10	4.70	
ไม่ได้ศึกษา	9	4.20	6	2.80	15	7.00	
รวม	134	62.90	79	37.10	213	100.00	

ตาราง 32 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านอายุของผู้ดูแลผู้ป่วย กับความต้องการด้านการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่บ้าน จำแนกตามความต้องการเมื่อมีภาวะเป็ยงเบนทางสุขภาพในรายข้อที่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (n=213)

ข้อที่	ความต้องการ	χ^2 -test	p-value
1	การทราบแหล่งประโยชน์ในชุมชนที่สามารถให้การช่วยเหลือผู้ป่วย	7.66	.11
3	ผลกระทบของโรคหลอดเลือดสมองที่มีผลต่อร่างกายของผู้ป่วย	11.61	.02*

*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ตาราง 33 แสดงการคำนวณข้อที่ 3 (ผลกระทบของโรคหลอดเลือดสมองที่มีผลต่อร่างกายของผู้ป่วย)

ตัวแปร	ต้องการ		ไม่ต้องการ		รวม		χ^2 -test
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
อายุ							
21 - 30 ปี	4	1.90	5	2.30	9	4.20	
31 - 40 ปี	8	3.80	22	10.30	30	14.10	
41 - 50 ปี	17	8.00	45	21.10	62	29.10	11.61*
51 - 60 ปี	5	8.60	43	20.20	48	22.50	
มากกว่า 60 ปี	24	11.30	40	18.80	64	30.0	
รวม	58	27.20	155	72.80	213	100.00	

ตาราง 34 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านสถานภาพสมรสของผู้ดูแลผู้ป่วย กับความต้องการด้านการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่บ้าน จำแนกตามความต้องการเมื่อมีภาวะเป็ยงเบนทางสุขภาพในรายชื่อที่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (n=213)

ข้อที่	ความต้องการ	χ^2 -test	p-value
1	การทราบแหล่งประโยชน์ในชุมชนที่สามารถให้การช่วยเหลือผู้ป่วย	2.04	.36
12	การทำหรือดูแลให้ผู้ป่วยทำความสะอาดอวัยวะสืบพันธุ์	7.49	.02*

*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ตาราง 35 แสดงการคำนวณข้อที่ 12 (การทำหรือดูแลให้ผู้ป่วยทำความสะอาดอวัยวะสืบพันธุ์)

ตัวแปร	ต้องการ		ไม่ต้องการ		รวม		χ^2 -test
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
สถานภาพสมรส							
คู่	84	139.40	76	35.70	160	75.10	
โสด	14	6.60	9	4.20	23	10.80	7.49*
หม้าย/หย่า/แยกกัน	24	11.30	6	2.80	30	14.10	
อยู่							
รวม	122	57.30	91	42.70	213	100.00	

* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ตาราง 36 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านระดับการศึกษาของผู้ดูแลผู้ป่วยกับความ ต้องการ ด้านการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่บ้าน จำแนกตามความ ต้องการเมื่อมีภาวะเป็ยงเบนทางสุขภาพในรายข้อที่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติ (n=213)

ข้อที่	ความต้องการ	χ^2 -test	p-value
1	การทราบแหล่งประโยชน์ในชุมชนที่สามารถให้การช่วยเหลือผู้ป่วย	7.84	.09
6	การสังเกตอาการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย	9.99	.04*

*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ตาราง 37 แสดงการคำนวณข้อที่ 6 (การสังเกตอาการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย)

ตัวแปร	ต้องการ		ไม่ต้องการ		รวม		χ^2 -test
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
ระดับการศึกษา							
ประถมศึกษา	57	26.80	110	51.60	167	78.40	
มัธยมศึกษา	2	0.90	13	6.10	15	7.00	
อนุปริญญา	4	1.90	2	3.30	6	2.80	9.99*
ปริญญาตรี	3	1.40	7	2.80	10	4.70	
ไม่ได้ศึกษา	9	4.20	6	64.80	15	7.00	
รวม	75	35.20	138	72.80	213	100.00	

* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05