

บทที่ 5

บทสรุป

สรุปผลการวิจัย

1. การศึกษาปริมาณผลผลิตและโภชนาของแนนเดงในบ่อทดลอง

การทดลองเลี้ยงแนนเดงในบ่อทดลองที่ใช้ปูยต่างชนิดในอัตราส่วนที่เท่ากันกับพบร่วมกัน พบว่า แนนเดงที่ได้รับปูยจากมูลสุกรในอัตราส่วน 1:1 ให้ปริมาณผลผลิตรวมสูงที่สุดที่ 688.09 กก./บ่อทดลอง ส่วนปริมาณโภชนาของแนนเดงในแต่ละ กลุ่มทดลอง ไม่แตกต่างกันมากนัก โดยแนนเดงที่ได้รับปูยจากมูลสุกรให้ปริมาณไปรติน เยื่อไช และแคลเซียมดีที่สุดเท่ากับ 20.42 15.25 และ 1.15 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ และแนนเดงที่ได้รับปูยจากมูลสุกรยังมีค่าพลังงานดีที่สุด เท่ากับ 3,650 กิโลแคลอรี่ต่อกิโลกรัม แนนเดงที่ได้รับปูยจากกากระกอนก้าวชีวภาพมีปริมาณไขมันดีที่สุดเท่ากับ 2.85 เปอร์เซ็นต์ แนนเดงได้รับปูยจากมูลโคมีปริมาณเด้า และฟอสฟอรัสดีที่สุดเท่ากับ 16.44 และ 1.26 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ

2. การศึกษาการย่อยได้ของโภชนาของแนนเดงในสุกร

การทดสอบการย่อยได้ของวัตถุแห้งในแนนเดงพบว่ามีค่าการย่อยได้เท่ากับ 75.31 เปอร์เซ็นต์ การย่อยได้ของโปรดีนในแนนเดงมีค่าการย่อยได้เท่ากับ 70.88 เปอร์เซ็นต์ การย่อยได้ของไขมันในแนนเดงมีค่าการย่อยได้เท่ากับ 83.39 เปอร์เซ็นต์ การย่อยได้ของเยื่อไชในแนนเดงมีค่าเท่ากับ 57.09 เปอร์เซ็นต์ การทดสอบพลังงานที่ย่อยได้และพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้ในแนนเดงพบว่ามีค่าเท่ากับ 2,371.26 และ 2,253.45 กิโลแคลอรี่ต่อกิโลกรัม ตามลำดับ

อภิปรายผลการวิจัย

1. การทดลองที่ 1 ศึกษาสภาพที่เหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโตของแนนเดง ในบ่อทดลอง

อัตราการเจริญเติบโต และการให้ผลผลิตแนนเดง

จากการทดลองแนนเดงสามารถเจริญเติบโตได้ดีและเพิ่มจำนวนได้อย่างรวดเร็วโดยมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นประมาณสองเท่าจากน้ำหนักที่ปล่อยลงไปในครั้งแรกซึ่งการใส่ปูยจากมูลสุกรในอัตราส่วน 1:1 จะให้ผลผลิต (น้ำหนักสด) เมื่อคิดเป็นตารางเมตรเท่ากับ 6.78 กิโลกรัม/ตารางเมตร ซึ่งมีอัตราการเพิ่มของผลผลิต แนนเดงเป็น 2.1 เท่า จากปริมาณแนนเดงที่ปล่อยลงไปในบ่อขนาด 0.32 ตารางเมตร จำนวน 1 กิโลกรัม ภายในระยะเวลา 7 วัน ในขณะที่ Brotonegero, (1976)

รายงานว่า แทนแดงสามารถเพิ่มจำนวนได้เป็น 2 เท่า ภายในเวลา 3-4 วัน ซึ่งอาจเป็นผลมาจากการโภชนาะในบ่อทดลองที่ได้จากปูยมูลสัตว์ทำให้การละลายของธาตุอาหารซึ่งก่อให้การเลี้ยงแทนแดงที่มีการใส่ปูยเมี๊ยดมีการละลายของธาตุอาหารได้ดีกว่าจึงทำให้การเจริญเติบโตของแทนแดงดีกว่า และจากรายงานของ

ซึ่งเมื่อคำนวณผลผลิตแทนแดงจากพื้นที่บ่อทดลอง 1 ไร่ จะสามารถผลิตแทนแดงได้ประมาณ 3,300 กิโลกรัม/ไร่ ภายในเวลา 21 วัน ซึ่งได้ปริมาณผลผลิตของแทนแดงมากกว่าการทดลองของ ประษุร และคณะ (2527) รายงานว่า เมื่อเริ่มเลี้ยงโดยใช้เชือพันธุ์ 50 กิโลกรัม/ไร่ แทนแดงพันธุ์ดีจะขยายตัวเต็มพื้นที่หนึ่งไร่ภายในเวลา 21 วัน ซึ่งมีน้ำหนักสดประมาณ 3,000 กิโลกรัม/ไร่ ซึ่งทั้งนี้อาจเป็นผลมาจากการพื้นที่ในบ่อทดลองไม่มีศัตรูพืชมา擾กวน เช่น ปลาและหอย ไม่ เมื่อนอกกับการเลี้ยงในบ่อธรรมชาติซึ่งอาจมีศัตรูมา擾กวนได้ จึงทำให้มีปริมาณผลผลิตที่ได้จากบ่อทดลองสูงกว่า แทนแดงสามารถเจริญเติบโตได้ในแหล่งน้ำที่มีสภาพความสมบูรณ์ดีจึงสามารถพบร่องน้ำแทนแดงได้ตามแหล่งน้ำธรรมชาติทั่วไป โดย pH ของน้ำในบ่อเลี้ยงแทนแดงตลอดระยะเวลาการทดลอง มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 6.4 ซึ่งจากรายงานของ Forni, et al., (2001), Arora and Singh, (2003) Van der, et al., (2006) ได้รายงานว่าองค์ประกอบทางเคมีและอัตราการเจริญเติบโตของแทนแดงขึ้นอยู่กับ pH น้ำ โดย pH ที่เหมาะสมแก่แทนแดงขึ้นอยู่กับชนิดของแทนแดง ในขณะที่อุณหภูมิของน้ำจากการทดลอง มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 29 องศาเซลเซียสซึ่งเป็นอุณหภูมิที่เหมาะสมกับแทนแดงพันธุ์ *A. microphylla* อยู่แล้วเนื่องจากแทนแดงพันธุ์นี้มีถิ่นกำเนิดอยู่ในเขตร้อน จึงทำให้แทนแดงเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งสอดคล้องกับรายงานของ Anonymous (1976), Brotonegero and Abdulkadir (1976) ที่รายงานว่า อุณหภูมิที่เหมาะสมในการเจริญเติบโตของแทนแดงจะอยู่ในช่วง 16-30 องศาเซลเซียส โดยแทนแดงแต่ละชนิดจะเจริญเติบโตได้ในอุณหภูมิที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับถิ่นกำเนิดของแทนแดงชนิดนั้นๆ

การทดสอบปริมาณโภชนาะของแทนแดง พบว่า ปริมาณโปรตีนของแทนแดงจากการทดลองมีค่าประมาณ 20% ซึ่งมีค่าต่ำกว่ารายงานของ Buckingham, et al., (1978), Sreemannaryana, et al., (1993) และ Singh, et al., (1983) ซึ่งรายงานว่า แทนแดง พันธุ์ *A. pinnata* จะมีปริมาณโปรตีนเท่ากับ 28% แต่มีค่าไกล์เดียงกับรายงานของ Tamang and Samanta (1993), Ali and Leeson (1995) ซึ่งรายงานว่าแทนแดง พันธุ์ *A. pinnata* จะมีปริมาณโปรตีน 21% ซึ่งปริมาณโปรตีนที่ได้จากแทนแดงอาจมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในการเลี้ยงด้วย สำหรับปริมาณเยื่อไขข่องแทนแดงจากการทดลองมีค่าเท่ากับ 15% ซึ่งมีค่าสูงกว่ารายงานของ Sreemannaryana, et al., (1993) และ Ali and Leeson (1995) ที่รายงานว่าแทน

แดงพันธุ์ *A. microphylla* มีปริมาณเยื่อไข่เท่ากับ 12.3% ซึ่งปริมาณเยื่อไข่ในเห็นแดงที่มีค่าสูงนั้น น่าจะเป็นผลมาจากการเก็บเกี่ยวของเห็นแดงซึ่งปกติแล้วพืชทุกชนิดเมื่ออายุมากขึ้น ปริมาณเยื่อไข็จะสูงขึ้นตามไปด้วย ปริมาณ ไขมัน เต้า แคลเซียม และฟอฟอรัส ที่ได้จากการทดลองมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.80 16.39 1.14 และ 1.24 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ ซึ่งไม่แตกต่างกับรายงานของ Alalade and Lyayi (2006) ที่กล่าวว่า เห็นแดงพันธุ์ *A. pinnata* มีปริมาณ ไขมัน เต้า แคลเซียม และฟอฟอรัส ประมาณ 2.7 16.2 1.16 และ 1.29 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ อาจเนื่องมาจากปริมาณไขมัน เต้า แคลเซียม และฟอฟอรัส ของเห็นแดงในแต่ละพันธุ์มีค่าใกล้เคียงกันแต่จะแตกต่างกันที่ปริมาณผลผลิตมากกว่าเนื่องจากสภาพแวดล้อมในการเลี้ยงแตกต่างกันจึงมีผลทำให้ปริมาณผลผลิตแตกต่างกัน และเห็นแดงที่ได้จากการทดลองมีค่าพลังงานเท่ากับ 3,648 kcal/kg ซึ่งมีค่ามากกว่ารายงานของ Alalade and Lyayi (2006) ที่กล่าวว่าเห็นแดงพันธุ์ *A. pinnata* มีพลังงาน 2,039 kcal/kg โดยปริมาณพลังงานของเห็นแดงอาจขึ้นอยู่กับปริมาณธาตุอาหารที่เห็นแดงได้รับเข้าไปและสายพันธุ์ของเห็นแดง

2. การทดลองที่ 2 ศึกษาการย่อยได้ของโภชนาะของเห็นแดงโดยสูกร การย่อยได้ของโภชนาะ

การย่อยได้ของโภชนาะทุกตัว ได้แก่ วัตถุแห้ง โปรตีน เยื่อไข่ ไขมัน พลังงานที่ย่อยได้ และพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้ โดยการย่อยได้ของโปรตีนในเห็นแดง (70.88%) มีค่าสูงกว่าในกระถิน (64.26%) การย่อยได้ของโปรตีนในเห็นแดงที่มีค่าสูงกว่าในกระถินอาจเนื่องมาจากการพิษที่อยู่ในกระถินที่ชื่อว่า ไมโนซีน โดย Liener, (1962) กล่าวว่า ไมโนซีนในกระถินนี้จะไปรบกวนการย่อยและการดูดซึมสารอาหารอื่นๆ ในระบบทางเดินอาหาร ส่วนการย่อยได้ของไขมันของใบกระถิน (86.68%) มีค่าสูงกว่าการย่อยได้ของเห็นแดง (83.39%) การย่อยได้ของวัตถุแห้งของเห็นแดง (75.31%) มีค่าสูงกว่าการย่อยได้ของใบกระถิน (73.54%) พลังงานที่ย่อยได้ของเห็นแดง (2371.26 kcal/kg) ซึ่งมีค่าต่ำกว่าพลังงานที่ย่อยได้ของและใบกระถิน (2374.30 kcal/kg) และพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้ของเห็นแดง (2253.45 kcal/kg) มีค่าต่ำกว่าพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้ของใบกระถิน (2257.94 kcal/kg) ซึ่งการย่อยได้ของโภชนาะต่างๆ ที่มีค่าต่ำนั้นเนื่องมาจากการย่อยได้ของโภชนาะต่างๆ การย่อยได้ของเยื่อไข่ของใบกระถิน (57.86%) มีค่าสูงกว่าการย่อยได้ของเห็นแดง (57.09%) การที่อาหารมีปริมาณเยื่อไข่ที่สูงจึงทำให้การย่อยได้ต่ำและทำให้คุณค่าทางอาหารที่ใช้ประโยชน์ได้ลดลง (อุทัย คันธ์, 2529) เนื่องจากเยื่อไข่เป็นตัวดูดน้ำระหว่างที่อยู่ในทางเดินอาหาร ทำให้อาหารมีความถ่วงจำเพาะสูงขึ้น อาหารจึงเคลื่อนที่เร็วขึ้น ขณะที่เอนไซม์ในทางเดินอาหารยังทำงานได้ไม่เต็มที่ ผลผลิตให้การย่อยได้ลดลง โดยจะสังเกตได้จากสุกรจะมีการขับถ่ายมูล

มากขึ้น แต่ถ้าสุกรมีอายุมากขึ้นจะทำให้การย่อยได้ช้าลง เยื่อไผ่กิ่งสุกรที่มีอายุน้อย เนื่องจากสุกรได้มีการพัฒนาระบบทางเดินอาหารดีขึ้น (Kidder and Manner, 1978)

ข้อเสนอแนะ

1. ในเชิงการผลิตแทนแดงควรทดลองเลี้ยงจนกว่าแทนแดงจะแสดงอาการขาดรากอาหาร เช่น การเปลี่ยนเป็นสีแดง เพื่อดูว่าปริมาณของปุ๋ยที่ใช้สามารถให้ผลผลิตแทนแดงได้สูงสุด ก็ต้องรับ
2. ควรมีการนำค่าการย่อยได้ช้าลงจากการทดลองไปใช้สำหรับผลิตในเชิงอาหารสัตว์ต่อไป

